

Amblyopie (Evaluation Initiale et lors du Suivi)

Traduit par Dr. Imene Ltaeif

Examen Initial, Histoire de la Maladie (Eléments clés)

- Symptômes et signes oculaires ^[A:III]
- Antécédents ophtalmologiques ^[A:III]
- Antécédents généraux comportant le déroulement de la grossesse, de la période périnatale et postnatale ^[A:III]
- Antécédents familiaux incluant l'état ophtalmologique et les **maladies générales pertinentes** ^[A:III]

Examen Ophtalmologique Initial (Eléments clés)

- Fixation et acuité visuelle ^[A:III]
- Alignement binoculaire et oculomotricité ^[A:III]
- Test de transillumination de Brückner ^[A:III]
- Examen des réflexes photomoteurs ^[A:III]
- Inspection ^[A:III]
- Examen du segment antérieur ^[A:III]
- Rétinoscopie / réfraction sous cycloplégique ^[A:III]
- Examen du fond de l'œil ^[A:III]

Prise en Charge Thérapeutique

- Une tentative de traitement doit être offerte à tous les enfants atteints d'amblyopie, quel que soit leur âge ^[A:III]
- Choisir le traitement adéquat tenant compte de l'âge du patient, de son acuité visuelle, de son adhésion à un traitement précédent ainsi que de ses conditions physiques, sociales et psychologiques ^[A:III]

- Le but du traitement est d'obtenir une acuité visuelle égale entre les deux yeux ^[A:III]
- Une fois l'acuité visuelle maximale est atteinte, le traitement devrait être progressivement diminué et éventuellement arrêté ^[A:III]

Evaluation lors du Suivi

- Les visites de contrôle doivent comporter:
 - L'évolution des signes fonctionnels ^[A:III]
 - L'adhésion à la stratégie de traitement ^[A:III]
 - Les effets secondaires du traitement ^[A:III]
 - L'acuité visuelle de chaque œil ^[A:III]
- L'examen de suivi est généralement prévu 2 à 3 mois après le début du traitement ^[A:III]
- Ce délai varie en fonction de l'intensité du traitement et de l'âge de l'enfant ^[A:III]
- Une surveillance continue est nécessaire parce qu'environ un quart des enfants traités avec succès subissent une rechute au cours de la première année suivant l'arrêt du traitement ^[A:III]

Education du Patient

- Discuter le diagnostic, la sévérité de la maladie, le pronostic ainsi que la stratégie thérapeutique avec le patient, ses parents et/ou tuteurs ^[A:III]
- Expliquer la pathologie et impliquer la famille dans la prise en charge thérapeutique ^[A:III]